



Tu mejor amigo merece los mejores cuidados.

Si tu perro tiene riesgo de padecer cáncer, las pruebas anuales de cribado de linfoma son esenciales.

El cáncer es la principal causa de muerte en perros adultos y el linfoma es uno de los tipos de cáncer más frecuente.¹ Si tu perro presenta riesgo* de padecer cáncer, incluyendo el linfoma, es importante realizar un seguimiento mediante un screening o cribado de cáncer como parte de las pruebas rutinarias de las revisiones anuales. Cuando el cáncer se detecta de forma temprana, se puede tratar de forma temprana.

Todos los perros



Razas de alto riesgo



Screening o cribado de linfoma.

Una de las neoplasias más frecuentes es el linfoma, que es un cáncer de la sangre que afecta al sistema linfático. Los signos visibles pueden variar. Algunos perros no muestran ningún signo clínico, mientras que otros pueden presentar pérdida de peso, vómitos, diarrea, bultos en el cuerpo o dificultad para respirar. El linfoma puede avanzar rápidamente en perros y, a menudo, los signos clínicos no son evidentes hasta que ya es demasiado tarde. Por este motivo es importante realizar periódicamente un screening de linfoma. Mediante el screening es más probable detectarlo de forma temprana.

Un simple análisis de sangre con posibilidades extraordinarias.

La detección del cáncer ha avanzado mucho. Según los datos preliminares, la prueba IDEXX Cancer Dx™ puede detectar el linfoma mediante un simple análisis de sangre, incluso en perros sin signos clínicos.² Si tu perro presenta riesgo de linfoma, habla con tu veterinario sobre las pruebas que se pueden hacer regularmente para detectarlo.

El bienestar empieza con un plan.

¿Cómo puedo saber si mi perro tiene riesgo de cáncer? Cuando un perro alcanza los 7 años de edad, las pruebas de screening son un elemento esencial para el mantenimiento de la salud. En algunas razas caninas estas pruebas se deberían realizar a los 4 años. Habla con tu veterinario sobre el riesgo de cáncer para poder elaborar un plan de salud adaptado a tus necesidades.

Las siguientes razas presentan un mayor riesgo de cáncer:

Golden retriever
Bulldog francés
Beagle
Bóxer
Schnauzer miniatura
Boyero de Berna
Retriever de pelo liso

Terrier escocés
Bullmastiff
Labrador retriever
Rottweiler
Dóberman pinscher
Bulldog inglés



Cuando se trata de cáncer, un resultado negativo es bueno.

Al igual que las personas, los perros con mayor riesgo de padecer cáncer deben someterse a cribados periódicos. Aunque la mayoría de los resultados no sean compatibles con linfoma, la mejor forma de detectar precozmente esta enfermedad es mediante cribados periódicos. Un resultado no compatible con linfoma no garantiza que tu perro no desarrolle linfoma u otro tipo de cáncer en el futuro.

Qué esperar de un resultado positivo.

Si los resultados de la prueba de tu perro son compatibles con linfoma, es posible que tu veterinario te recomiende una consulta de seguimiento a las 4-8 semanas o una evaluación adicional, según los signos clínicos. Si se confirma el linfoma, los próximos pasos podrían incluir la derivación a un especialista o considerar varias opciones de tratamiento como la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía o los cuidados paliativos. Muchos perros toleran bien la quimioterapia y mantienen una buena calidad de vida durante el tratamiento.^{3,4} Los cribados periódicos son fundamentales para garantizar la atención adecuada y los cuidados precisos.

¿El mejor regalo para tu perro? Llegar a la vejez.

Las pruebas de cribado de cáncer representan solo una parte de los planes de salud del perro. Junto con la alimentación, el ejercicio, las pruebas de cribado y todo el cariño del hogar, podemos ayudar a tu perro a vivir una vida larga y saludable.

Para más información visita wearethecure.org y fetchacure.org.

Habla con tu veterinario sobre el cribado de linfoma.

IDEXX

IDEXX Laboratories, Inc.
One IDEXX Drive
Westbrook, Maine 04092
Estados Unidos

* Los perros en riesgo incluyen todos los perros de ≥ 7 años y los de razas de alto riesgo de ≥ 4 años.

Referencias

1. What are the most common types of cancers in dogs? How many dogs typically get cancer? Veterinary Cancer Society; 2021. Consultado el 3 de febrero de 2025. www.vetcancersociety.org/pet-owners/faqs
2. Datos en archivo de IDEXX Laboratories Inc. Westbrook, Maine (EE. UU.): Datos basados en pruebas realizadas en los Laboratorios de Referencia IDEXX en Norteamérica entre el 1 de noviembre de 2024 y el 6 de diciembre de 2024. Informe de análisis: IDEXX Cancer Dx Validation, 100282 [008_CancerDx-Validation-Report-2.Rmd].
3. Bergmann M, Sauter-Louis C, Hirschberger J. Lebensqualität und Lebenserwartung am malignen Lymphom erkrankter Hunde unter Chemotherapie. Eine Besitzerumfrage. *Tierarzt Prax Ausg K Kleintiere Heimtiere*. 2011;39(4):229–236.
4. Bianchi ML, Drudi D, Treggiari E, et al. Quality of life assessment in cancer patients receiving single-agent versus multidrug chemotherapy protocols. *Open Vet J*. 2021;11(4):755-763. doi:10.5455/OVJ.2021.v11.i4.28

© 2026 IDEXX Laboratories, Inc. Todos los derechos reservados. • 09-2692490-00
Todas las marcas ®/TM son propiedad de IDEXX Laboratories, Inc. o de sus filiales en los Estados Unidos u otros países. La política de privacidad de IDEXX está disponible en idexx.com.

